

Vážená pani doktorka,

Vážený pán doktor,

dovoľte, aby sme Vás informovali, že od augusta 2013 je terlipressín dostupný v Slovenskej republike v **dvoch registrovaných prípravkoch**:

GLYPRESSIN 1 mg

REMESTYP 1,0 mg

GLYPRESSIN je indikovaný na liečbu krvácania z varixov pažeráka. Glypressin je možné uchovávať pri izbovej teplote a je dostupný v balení prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.



REMESTYP je indikovaný na krvácanie z tráviaceho a urogenitálneho ústrojenstva u dospelých a detí – napr. z pažerákových varixov, gastrických a duodenálnych vredov, pri funkčných a iných metrorágiách, pri pôrode a potrate a pod. Ďalšími indikáciami sú krvácanie spojené s operáciami, obzvlášť v oblasti brucha a malej panvy, lokálne použitie napr. pri operáciách krčka maternice. Remestyp je dostupný v injekčnom roztoku pripravenom na aplikáciu a je potrebné uchovávať ho v chladničke pri teplotách 2 – 8 °C (počas 1 mesiaca možno liek uchovávať pri teplote do 25 °C – napr. v sanitke).



Dávkovanie a spôsob podávania terlipressínu:

Na úvod sa podáva intravenózna injekcia 2 mg terlipressínu každé štyri hodiny. Liečba musí pokračovať až dovtedy, pokiaľ krvácanie nie je pod kontrolou aspoň 24 hodín, ale maximálne do 48 hodín. Dávky, ktoré nasledujú po úvodnej dávke, sa môžu znížiť na 1 mg i. v. každé 4 hodiny u pacientov s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg alebo ak je to nevyhnutné kvôli nežiaducim účinkom.

Podľa odporúčaní Baveno V. by vazoaktívne látky mali byť užívané v kombinácii s endoskopickou terapiou nepretržite minimálne 5 dní (1A).

Pred podaním sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností týchto liekov (SPC).

S pozdravom,



Arnoldas Doviltis, MD
General Manager

FERRING Slovakia s.r.o., BC Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava,
Tel.02/5441 6010, Fax: 02/ 5441 1770
www.ferring.sk

GLY 02/08/13 v.1